

NOTE
SUR QUELQUES SYRPHIDES (DIPT.)
DU MUSÉE DU CONGO BELGE

PAR

J. HERVÉ-BAZIN

Professeur à l'Université catholique d'Angers.

M. le D^r H. SCHOUTEDEN a bien voulu me permettre d'étudier ces Syrphides du Congo belge. En voici la liste :

1. — *Xanthogramma aegyptium* WIED.

1 ♂, Ankoro, 30 octobre 1911 (D^r BEQUAERT); 1 ♀, Ganda-Sundi, 10-15 juin 1912 (R. MAYNÉ).

2. — *Asarcina ericetorum* F. var. *usambarensis* BEZZI.

1 ♀ : Beni à Lesse, fin juillet 1911 (D^r MURTULA).

3. — *Asarcina amæna* AUSTEN.

3 ♀, même provenance.

4. — *Syrphus* sp.?

1 ♀ en mauvais état, même provenance.

5. — *Megaspis fronto* LOEW.

1 ♀, même provenance.

6. — *Megaspis incisa* WIED.

2 ♀, même provenance. Une de ces ♀ est de coloration très claire. Peut-être est-elle immature.

7. — *Lathyrophthalmus euzonus* LOEW.

2 ♀, même provenance.

8. — *Mesembrius strigilatus* BEZZI.

1 ♀, même provenance.

9. — *Microdon erythros* BEZZI.

1 ♀, même provenance.

10. — *Protylocera Ellioti* AUSTEN, var. *claricella* SPEISER.

1 ♂, 3 ♀, même provenance.

Ces quatre individus ne présentent aucune différence de forme avec *P. Ellioti*, dont ils ne se distinguent que par la teinte gris clair, à peine jaunâtre, du thorax et par l'absence de reflets pourprés aux ailes. Je les rapporte à la v. *claricella* SPEIS., bien qu'ils s'en séparent par la teinte brune générale assez accentuée des ailes. Y a-t-il là une seule espèce très variable, ou plusieurs espèces? L'identité absolue de coloration des quatre exemplaires que j'ai sous les yeux plaide en faveur de cette dernière opinion.

11. — *Protylocera griseifacies* BEZZI.

1 ♂, Bukama, 4 juin 1911 (D^r BEQUAERT); 2 ♀, Kassongo (D^r PONS).

12. — *Eristalodes* sp.?

1 ♀, du Katanga, voisine d'*E. taeniops* WIED. Cette espèce est sans doute nouvelle, mais l'exemplaire est en mauvais état, mouillé et frotté.

13. — *Eumerus Paulae* HERVÉ-BAZIN.

1 ♂, Kassongo (D^r PONS).

14. — *Syritta bulbulus* SPEISER.

1 ♀, Congo da Lemba, mai 1912 (R. MAYNÉ).
